

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

Prunus cerasus L., 1753 =>

Griottier

OK pour diffusion

Pyrus L., 1753

Poire à pulpe douce avec granules pierreux. Fleurs généralement blanches, anthères rouge-carmin ; styles libres dès la base.

3-20 m ; Viv. ; III-IV.

LC, **LC**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780 =>


OK pour diffusion

Rosa L., 1753

Les dessins figurant dans la clé des Rosa ont été réalisés par Alexandre Paluos sous licence CC BY-NC-SA alexandrepaluos@orange.fr

Pour le genre Rosa, nous pouvons distinguer 3 types floraux :

- D (pour dense) : ouverture du canal styloïde >1,2mm, sépales dressés lors du rougissement du cynorhodon et persistants, pédoncules plus courts que le cynorhodon.
- L (pour lâche) : ouverture du canal styloïde <0,8mm, sépales rabattus lors du rougissement du cynorhodon et rapidement caducs; pédoncules plus long que le cynorhodon.
- L/D (intermédiaire) : ouverture du canal styloïde 0,8 -1,2mm, sépales étalés lors du rougissement du cynorhodon et plus ou moins persistants, pédoncules environ égal au cynorhodon.



- 1** Styles +/- soudés en une colonne dépassant l'orifice discal de 2-6 mm (fig.) ou Styles imparfaitement soudés, au moins les extérieurs tendant à se séparer à la fructification.

Groupe A



- 1'** Styles fasciculés mais non soudés, généralement seuls les stigmates dépassant l'orifice discal de 1-2 mm.

2



VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

- 2** Feuilles couvertes d'une pruine dense et mate donnant une teinte bleutée à pourpre ; rameaux, feuilles et jeunes fruits tendant souvent à rougir rapidement ; sépales entiers, rarement avec des segments latéraux.

LC, **NT**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa glauca Pourr., 1788 =>




- 2'** Feuilles jamais couvertes d'une pruine dense et mate.

3


- 3** Sépales tous entiers sur toutes les fleurs (sauf parfois quelques rares segments, mais alors les feuilles sont velues sur les 2 faces et les aiguillons droits : voir *Rosa villosa*).

Groupe B



- 3'** 2 ou 3 des sépales munis de segments latéraux au moins sur certaines fleurs.

Groupe C



Rosa - Groupe A

- 1** Styles parfaitement soudés ne se séparant pas à la fructification.

2

- 1'** Styles imparfaitement soudés au moins les extérieurs tendant à se séparer à la fructification.


NE, **NT**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa stylosa Desv., 1809 =>

- 2** Stipules bordées de nombreuses franges filiformes ; inflorescence en panicule ± pyramidale

NAa, **NA**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa multiflora Thunb., 1784 =>




- 2'** Stipules entières, dentées ou à 1-2 paires de courtes franges ; inflorescence ombellée, corymbiforme ou 1-flore

LC, **LC**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST


Rosa arvensis Huds., 1762 =>



Rosa - Groupe B

1	Jeunes rameaux glabres ; segments foliaires souples	2
1'	Jeunes rameaux densément poilus ; segments foliaires coriaces NAa, NA , , Catégorie PEE : PE Sans objet	

Rosa rugosa Thunb., 1784 =>



2	Segments foliaires glabres au moins sur la face supérieure.	3
2'	Segments foliaires densément poilus sur les 2 faces.	Groupe G
3	Pédoncule fructifère rigide et droit ; fruits normalement à L/l inférieur à 1,2 ; pétales blancs ou rarement roses LC, NT , , Catégorie PEE : PE Sans objet	

Rosa spinosissima L., 1753 =>

3'	Pédoncule fructifère retombant ; fruits souvent à L/l supérieur à 1,2 ; pétales roses à purpurins	4
4	Aiguillons droits, très irrégulièrement répartis, généralement denses à la base des tiges et manquants sur les jeunes rameaux ; fruits à L/l généralement supérieurs à 1,4. LC, LC , , Catégorie PEE : PE Sans objet	

Rosa pendulina L., 1753 =>

4'	Aiguillons droits ou courbés, ± régulièrement répartis ; fruits à L/l généralement inférieur à 1,4 NE, NE , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
-----------	---	--

Rosa x reversa Waldst. & Kit., 1812 =>

Rosa - Groupe C

1	Aiguillons très denses (généralement plus de 100/100 mm sur les jeunes rameaux) et très hétérogènes en taille et en forme ; plante inférieure à 1m de haut, normalement en colonie	2
1'	Aiguillons nettement moins denses, homo- ou hétérogènes ; plante < ou > 1 m de haut, solitaire, en petit groupe ou en colonie	3
2	Styles non émergents (seuls les stigmates le sont), libres ; segments foliaires coriaces, gaufrés	

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

par la nervation enfoncée à la face supérieure ; fruits majoritairement fertiles
 LC, **EN**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa gallica L., 1753 =>

- 2'** Styles émergents en colonne, partiellement soudés ; segments foliaires souples, non gaufrés, fruits majoritairement stériles
 NE, **NE**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa x polliniana Spreng., 1815 =>



- 3** Segments foliaires légèrement gaufrés par la nervation enfoncée à la face supérieure ; rachis foliaire couvert de glandes stipitées rigides donnant une sensation de scabridité au toucher ; pédoncule et hypanthium fortement glanduleux ; fl. majoritairement larges de 50-80 mm ; pétales roses
 DD, **NE**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa marginata Wallr., 1815 =>

- 3'** Segments foliaires non gaufrés ; rachis foliaire avec ou sans glandes stipitées, spinuleux mais non scabre au toucher ; pédoncule et hypanthium glabres à fortement glanduleux ; fl. majoritairement larges de 30-60 mm ; pétales roses ou blancs.

4


- 4** Face inférieure des segments foliaires entièrement ponctuée de glandes très apparentes, jaunâtres à brunâtres, généralement à odeur de pomme par temps chaud (fig.) ; face supérieure des segments foliaires glabre ou à poils épars ; aiguillons au moins en partie courbés en faux ou crochus (fig.)

Groupe D



- 4'** Face inférieure des segments foliaires sans glandes, ou à glandes éparses sur les nervures principale et secondaires, ou à glandes masquées par les poils, jamais à odeur de pomme ; face supérieure des segments foliaires glabre à très densément poilue ; aiguillons droits à crochus (fig.)

5



- 5** Segments foliaires entièrement glabres (ne pas tenir compte d'éventuelles glandes)

Groupe E

- 5'** Segments foliaires poilus, au moins à la face inférieure des nervures


6

- 6** Au moins certains aiguillons des axes ligneux courbés en faux ou crochus (fig.) et/ou à base brusquement élargie sur plus de 30 % de

Groupe F


VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

leur longueur (fig.); feuilles ± poilues, mais ne paraissant que très rarement grisâtres sur les 2 faces



- 6'** Aiguillons des axes ligneux tous droits à faiblement courbés (fig.), à base brusquement élargie sur moins 1/3 de leur longueur (fig.) ; feuilles densément poilues et paraissant grisâtres sur les 2 faces


Groupe G



Rosa - Groupe D


- 1** Base des segments foliaires majoritairement arrondie (fig.); pédoncule généralement glanduleux et souvent aciculés ; pétales normalement rose franc à purpurins

2



- 1'** Base des segments foliaires nettement cunéiforme (fig.); pédoncule glabres ou rarement glanduleux ; pétales souvent blancs à rose très pâle, rarement rose.

4



- 2** Type floral L (cf. description du genre) ; styles glabres ; sépales. réfléchis à la fructification ; caduques lors du rougissement ; pétales généralement rose vif .
 NE, **DD**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812 =>

- 2'** Type floral D ou D/L (cf. description du genre) ; styles poilus ; sépales étalés à dressés ; pétales rose.

3

- 3** Type floral D/L (cf. description du genre) ; sépales plus ou moins étalés lors du rougissement.
 NE, **NE**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa gremlii (Christ) Christ ex Greml, 1874 =>

- 3'** Type floral D (cf. description du genre) ; sépales dressés, persistant sur le cynorhodon.
 LC, **LC**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa rubiginosa L., 1771 =>

- 4** Type floral L (cf. description du genre) ; styles glabres ; sépales. réfléchis à la fructification ;

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

caduques lors du rougissement ; pétales généralement blancs ou rarement rose clair.

LC, **NT**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa agrestis Savi, 1798 =>

4'	Type floral D ou D/L (cf. description du genre) ; styles poilus ; sépales étalés à dressés ; pétales généralement roses.	5
-----------	---	----------

5	Type floral D/L (cf. description du genre), sépales plus ou moins étalés lors du rougissement. NE, NE , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
----------	---	--

Rosa inodora Fr., 1814 =>

5'	Type floral D (cf. description du genre) ; sépales dressés, persistant sur le cynorhodon. NE, NT , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
-----------	--	--

Rosa elliptica Tausch, 1819 =>

Rosa - Groupe E

1	Type floral L (cf. description du genre) ; styles glabres ; sépales. réfléchis à la fructification ; caduques lors du rougissement.	
----------	--	--

LC, **LC**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa canina L., 1753 =>

1'	Type floral D ou D/L (cf. description du genre) ; styles poilus ; sépales étalés à dressés.	2
-----------	---	----------

2	Type floral D/L (cf. description du genre), sépales plus ou moins étalés lors du rougissement. NE, NE , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
----------	---	--

Rosa subcanina (Christ) Vuk., 1887 =>

2'	Type floral D (cf. description du genre) ; sépales dressés, persistant sur le cynorhodon. NE, DD , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
-----------	--	--

Rosa dumalis Bechst., 1810 =>

Rosa - Groupe F

1	Styles 1,5-6 mm, en partie soudés, tendant à se séparer ou à tomber à la fin ; disque fortement conique, supérieur à 1,5 mm de hauteur, souvent teinté de blanc à sa partie supérieure NE, NT , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
----------	--	--

Rosa stylosa Desv., 1809 =>

1'	Styles inférieurs à 2,5 mm, libres, persistants ; disque modérément conique à concave, inférieur à 1,5 mm de hauteur, jamais teinté de blanc	2
-----------	---	----------

2	Feuilles simplement dentées, à rachis non glanduleux	3
----------	--	----------

2'	Feuilles doublement dentées, à rachis glanduleux	6
-----------	--	----------

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST

3	Type floral L (cf. description du genre); styles glabres ; sépales réfléchis à la fructification ; caduques lors du rougissement. NE, LC , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790 =>
3'	Type floral D ou D/L (cf. description du genre) ; styles poilus ; sépales étalés à dressés, persistant lors du rougissement du cynorhodon.	4
4	Type floral D/L (cf. description du genre), sépales plus ou moins étalés lors du rougissement. NE, DD , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk., 1887 =>
4'	Type floral D (cf. description du genre) ; sépales dressés, persistant sur le cynorhodon.	5
5	Pédoncule, hypanthium et fruits non glanduleux, sauf très rares exceptions ; face inférieure des segments foliaires sans glandes, sauf parfois sur les nervures principale et secondaires. NE, DD , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa caesia</i> Sm., 1812 =>
5'	Pédoncule, hypanthium et fruits hérissés de soies glanduleuses ; face inférieure des segments foliaires munie de glandes dispersées sur l'ensemble du parenchyme et souvent peu visibles dans les poils. (voir groupe G)	Groupe G
6	Type floral L (cf. description du genre) ; Pédoncule, hypanthium et fruits non glanduleux ; feuilles inodores ; sépales réfléchis, rapidement caduques. , , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa balsamica</i> Besser, 1815 =>
6'	Type floral D/L (cf. description du genre) . Pédoncule, hypanthium et fruits hérissés de soies glanduleuses ; sépales étalées, plus ou moins persistants ; feuilles à odeur résineuse ± marquée. NE, NE , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa abietina</i> Gren. ex Christ, 1873 =>

Rosa - Groupe G

1	Type floral L ou D/L (cf. description du genre) ; styles glabres à faiblement velus ; sépales rabattus ou étalés.	2
1'	Type floral D (cf. description du genre)	3
2	Type floral L (cf. description du genre) ; sépales caduques lors du rougissement du cynorhodon. LC, LC , , Catégorie PEE : PE Sans objet	
		<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 =>
2'	Type floral D/L (cf. description du genre) ; sépales généralement persistants lors du rougissement du cynorhodon , étalés à dressés obliquement.	

VERSION EN COURS D'ELABORATION
UTILISATION RESERVEE AUX MEMBRES DE LA SBA POUR TEST


NE, **NA**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa pseudoscabriuscula (R.Keller) Henker & G.Schulze, 1993 =>

- 3** Aiguillons nettement élargis sur plus de leurs 12 % du bas (fig), droits ou arqués ; segments latéraux des sépales bien développés ; sépales dressées obliquement ; plante normalement isolée ou en groupe réduit.

NE, **NE**, , Catégorie PEE : PE Sans objet


Rosa sherardii Davies, 1813 =>



- 3'** Aiguillons discrètement élargis au plus sur leurs 12 % du bas(fig), toujours droits ; segments latéraux des sépales absents ou peu nombreux ; sépales dressés verticalement ; plante normalement en colonie.

LC, **VU**, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rosa villosa L., 1753 =>



OK pour diffusion

Rubus L., 1753

La clé de détermination du genre *Rubus* a été élaborée par :

François VERNIER (francois.vernier@etik.com) et Jean-Marie ROYER

(jeamar.royer@wanadoo.fr)

- 1** Turion herbacé ou presque herbacé, feuilles à 3 folioles, moins de 10 drupéoles rouge vif. 15-30 cm.

RRR, Bas-Rhin, Haut-Rhin, mai-juin, forêts jusqu'à 1300 m d'altitude, hémisciaphile à héliophile, neutrocline à large amplitude, calcaricole, mésotrophile, mésoxérophile, eurasiatique, hémicryptophyte, LC, NT, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rubus saxatilis L., 1753 =>

Ronce des rochers

- 1'** Tige ligneuse.

2

- 2** Turion inerme sur sa partie supérieure, aiguillons fins présents essentiellement sur la base de la tige, feuilles à 5 parfois 7 folioles pennées, à face inférieure portant des poils ondulés, étalés formant un tomentum blanc, fruit à plus de 15 drupéoles tomenteuses (framboise) rouge vif à rouge framboise se détachant de son réceptacle conique et aigu. 0,6-1,5 m.

CCC, Bas-Rhin, Haut-Rhin, mai-juil., haies, fourrés, forêts claires, héliophile à hémisciaphile, neutro- à acidicline, mésotrophile, mésophile, circumboréal, eurasiatique. LC, LC, , Catégorie PEE : PE Sans objet

Rubus idaeus L., 1753 =>